

die andere Form des Scheitels dagegen zu sprechen scheint. In diesem Falle würde für die Spezies der Name des Mannes zu behalten sein.

5. Gen. *Monophadnus* Htg.

1. *M. alveatus* n. sp. ♂ ♀ Rufus, nitidus; capite, abdominis apice, pedum tibiis tarsisque nigris; tibiis anticis antice rufatis; alis fuscis; venis et stigmatibus nigris.

Elongatus, fere cylindricus; maris abdomine subdepresso; capite et tibiis nigro-, thorace luteo-pilosulis; capite pone oculos angustato; clypeo elongato, apice rotundato-truncato; palpis longis, nigris, medio magis minusve pallescentibus; antennis abdomen longitudine aequantibus, medio incrassatis; brunneo-pilosulis; articulo tertio 4<sup>o</sup> longiore; fronte inter antennis alveata, supra 2 scrobiculis parvis coarctata; area pentagona nulla; ocellis superioribus in linea oculos tangente positus; vertice longitudine sua sesqui latiore; alarum nervo radiali fere interstitiali; nervo tertio cubitali obliquo, cum cubito, angulum acutum efficiente; cellula tertia cubitali 2<sup>a</sup> longiore; abdominis segmentis dorsalibus 5—8 medio nigris, utrobique rufis; feminae vagina subexserta, fusco-pilosa. — Long. 9—10 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

6. Gen. *Stromboceros* Kuw.

1. *Str. tribrachys* n. sp. ♂ ♀ Niger, nitidus; prothorace, mesonoto, scutellis, tegulis, episternis, mesopleurorum limbo superiore et posteriore, metapleurorum maiore parte, pedibus rufis; abdominis dorso medio per longitudinem rufato; mesonoti 3 maculis nigris, quarum prima partem anteriorem lobi medii, ceterae partem posteriorem loborum lateralium obtinent; pedum anteriorum tarsis fuscis, tibiis postice fusco-lineatis; pedum posteriorum unguiculis nigricantibus; alis dilute fuscescentibus; venis nigricantibus; costa, area intercostali, stigmatibus testaceis.

Elongatus; capite et mesonoto nigro-pilosulis; mesopleuris subtilissime cano-pubescentibus; capite pone oculos angustato; clypeo apice emarginato; palpis medio rufescentibus, basi apiceque nigricantibus; antennis nigro-pilosulis, abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio 4<sup>o</sup> vix longiore; fronte supraantennali late longitudinaliter impressa; ocellis superioribus in linea oculos tangente sitis; vertice latitudine sua fere longiore; alarum nervo discoidali longius ante cubiti originem sito; cubiti basi fortius arcuata; cellula

tertia cubitali 2<sup>a</sup> vix longiore; feminae vagina vix exserta, apicem versus incrassata, apice rotundata et breviter nigro-pilosula. — Long. 9—11 mm.

Patria: Brasilia (Santos).

2. *Str. aemulus* n. sp. ♂♀ Rufus, nitidus; capite anoque nigris; abdominis 2 seriebus macularum dorsalium nigrificantibus; tarsorum unguiculis fuscis; alis dilute fuscescentibus; venis fuscis; costa, area intercostali, stigmatate testaceis.

Elongatus; capite et mesonoto nigro-pilosulis; mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos fortius angustato; clypeo submarginato-truncato; palpis rufis, maxillaribus longis; antennis nigris, basi magis minusve rufatis, fusco-pilosulis, abdomen longitudine superantibus; articulo primo saepius nigro; secundo et tertii basi pallidis; articulo tertio 4<sup>o</sup> parum longiore; fronte supraantennali late sed non profunde impressa; vertice quadrato; alarum nervo discoidali minus longe a cubiti origine distante; cubiti basi leniter arcuata; cellula tertia cubitali 2<sup>a</sup> longiore; nervo tertio cubitali medio incurvo. — Long. 9—11 mm.

Patria; Brasilia (Santos).

3. *Str. absonus* n. sp. ♂♀ Rufus, nitidus; capite, mesonoti macula anteriore, abdominis apice inde a segmento 8<sup>o</sup>, pedum tibiis — basi excepta — et tarsis nigris.

Parvus, angustus; capite et mesonoto fusco-pilosulis; hoc pone oculos fortiter rotundato-angustato; temporibus brevissimis; clypeo truncato; antennis nigro-pilosulis, abdomen longitudine aequantibus; articulo tertio 4<sup>o</sup> sesqui longiore; fronte supra antennis bis punctiformiter impressa et utrobique scrobiculo maiore determinata; area pentagona deleta; vertice longitudine sua duplo latiore; alis fuscescentibus; venis et stigmatate fuscis; cubiti basi recta, a nervo discoidali vix remota; cellula tertia cubitali 2<sup>a</sup> fere brevior; nervo 1<sup>o</sup> cubitali interdum oblitterato; feminae vagina vix exserta. — Long. 6—7 mm.

Patria: Bolivia.

Dem peruanischen *Str. notabilis* sehr ähnlich, aber an der rotgelben Brust, der Bildung der Stirn und dem geraden Cubitus leicht zu unterscheiden.